



# VERSA®

## FICHA TÉCNICA NUTRICIÓN



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.  
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170  
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160  
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila  
Tel. 01 (871) 705 40 00

# Distingo®

**DISTINGO®** (Ácido Giberélico)

**RSCO-013/1/10**

**Formulación:** Polvo soluble

### Información general:

**DISTINGO®** es un regulador de crecimiento vegetal en polvo que mejora las condiciones de los cultivos al producir elongamiento y multiplicación celular, acelera la floración y mejora la calidad de los frutos. **DISTINGO®** está elaborado a base de ácido giberélico, una hormona vegetal natural. Para obtener resultados óptimos, cuando se aplica **DISTINGO®**, se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35°C.

### Composición garantizada:

Ácido Giberélico (Ag<sub>3</sub>)

10.00%

### Propiedades de **DISTINGO®**:

Apariencia: Polvo fino de color blanco

Clasificación: Regulador de Crecimiento

pH: 3.2

Cultivos	Dosis g/100 L de agua	Época de aplicación
Alfalfa	20	Aplicar 10-15 días después de cada corte durante otoño e invierno.
Café	20	Aplicar 30 días antes de la cosecha.
Calabacita	15 - 25	10 días después de plantar y en plena floración.
Chile	25 - 45	10 días después de plantar y en plena floración.
Col	20	15 y 45 días después de trasplantar
Espinaca	30	Al tener plantas con 3 o 4 hojas y 7 días después.
Frijol. Soya y Chícharo	10	A principios de la floración.
Fresa	20	4 semanas después del transplante.



# FICHA TÉCNICA NUTRICIÓN



## VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.  
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170  
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160  
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila  
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Dosis g/100 L de agua	Época de aplicación
Cítricos	10	Un mes antes de la recolección o cosecha.
	20	Aplicación al follaje al inicio de la floración.
Melón, Pepino y Sandía	40	Aplicación al fruto 3 semanas antes de la cosecha.
Ornamentales	20	Durante el desarrollo vegetativo.
Jitomate	25 - 45	Desde la aparición de los ramilletes florales.
Uva sin semilla	20	Antes de la floración asperjando los racimos. Mejora la apertura del racimo y aumenta el tamaño de la fruta.

### Métodos para preparar y aplicar el producto:

Con la ayuda de unas tijeras abra el empaque, y mida en una báscula la cantidad de **DISTINGO®** necesaria, según la dosis indicada. Cloque la cantidad medida en un recipiente lleno a la mitad de su capacidad con agua limpia y agite, llene a su capacidad el recipiente y vuelva a agitar.

### Incompatibilidad:

**DISTINGO®** sólo deberá mezclarse con productos registrados en cultivos autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés, Polisulfuro de Calcio y productos de cobre.

### Presentaciones disponibles:

Bolsa 10 g.

Fecha de actualización: Marzo 2018

